



# Roofmijten assortiment

## Koppert

Roofmijt	Plaag	Meest effectief bij	Producten
 <p><i>Amblydromalus limonicus</i></p>	<p><b>Trips:</b> eerste en tweede larvenstadia van verschillende tripssoorten  <b>Wittevlieg:</b> eieren en larven</p>	13 - 27°C	 <p>Limonica</p>
 <p><i>Amblyseius swirskii</i></p>	<p><b>Trips:</b> eerste larvenstadium van verschillende tripssoorten  <b>Wittevlieg:</b> eieren en larven</p>	20 - 32°C	     <p>Swirski-Mite Swirski-Mite Plus Swirski-Mite Plus Swirski-Mite LD Swirski-Mite</p>
 <p><i>Transeius montdorensis</i></p>	<p><b>Trips:</b> eerste en tweede larvenstadia van verschillende tripssoorten  <b>Wittevlieg:</b> eieren en larven</p>	20 - 32°C	   <p>Montdo-Mite Montdo-Mite Plus Montdo-Mite</p>
 <p><i>Amblyseius andersoni</i></p>	<p><b>Trips:</b> eerste larvenstadium van verschillende tripssoorten  <b>Wittevlieg:</b> eieren en larven</p>	13 - 27°C	  <p>Anso-Mite Plus Anso-Mite</p>
 <p><i>Neoseiulus cucumeris</i></p>	<p><b>Trips:</b> eerste larvenstadium van verschillende tripssoorten</p>	15 - 25°C	    <p>Thripex Thripex-V Thripex Plus Thripex</p>
 <p><i>Phytoseiulus persimilis</i></p>	<p><b>Kasspintmijt of Bonenspintmijt</b> (<i>Tetranychus urticae</i>) en andere <i>Tetranychus</i> spp., behalve <i>Tetranychus evansi</i></p>	13 - 27°C	   <p>Spidex Spidex Vital Spidex Vital Plus</p>
 <p><i>Neoseiulus californicus</i></p>	<p><b>Spintmijt</b> (<i>Tetranychus urticae</i>); <b>Fruitspint</b> (<i>Panonychus ulmi</i>); <b>Citrusrode mijt</b> (<i>Panonychus citri</i>); andere soorten spintmijten</p>	13 - 32°C	    <p>Spical Spical-Plus Spical Ulti-Mite Spical</p>

koppert.nl

